

対象疾患: GEM+S-1 併用療法(1コース4週)／手術不能 胆道癌

薬品名	薬品名(商品名／略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
ゲムシタビン	ゲムシタビン点滴静注用「タイホウ」／GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day 1,15	隔週投与
テガフル・ギメラシル・オテラシルK	エヌケーエスワン配合OD錠T20・25／ S-1	下記に準ず	経口		day 1～14	2週投与2週休薬

投与基準
PS: 0～2
Hb > 9.0g/dL
WBC ≥ 3000
PLT ≥ 100,000
総ビリルビン 3.0mg/dL 以下
非血液毒性: Grade 0、1
AST及びALT: 200 IU/mL 以下
血清クレアチニン: 1.1mg/dL 以下(男)、0.9mg/dL 以下(女)
年齢: 20歳以上80歳以下
コメント: 上記基準を満たさない場合はTS-1、GEMともに1週間休薬

体表面積	S-1 投与量
1.25m ² <	40mg /回 × 2/日
1.25m ² ～1.5m ²	50mg /回 × 2/日
1.5m ² >	60mg /回 × 2/日

<文献>

- 1) Multicenter, phase II study of gemcitabine and S-1 combination chemotherapy in patients with advanced biliary tract cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2010 May;65(6):1101-7.
- 2) A multicenter phase II study of gemcitabine and S-1 combination chemotherapy in patients with unresectable pancreatic cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2010 Feb;65(3):527-36.
- 3) S-1 and gemcitabine as an outpatient-based regimen in patients with advanced or metastatic pancreatic cancer. Jpn J Clin Oncol. 2009 Jan;39(1):49-53.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。