

対象疾患:XELOX療法(1コース3週)／大腸癌

薬品名	薬品名(商品名／略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
カペシタビン	カペシタビン錠300mg／(CAP)	1000mg/m ² × 2回／日	経口		day 1～14	3週ごとに投与
オキサリプラチン	オキサリプラチン点滴静注液／(L-OHP)	130mg/m ²	点滴静注	120分	day 1.	3週ごとに投与

投与コース数:PDまで

投与基準(オキサリプラチン)	投与基準(カペシタビン)
PS:0～2	PS:0～2
WBC≥3000/mm ³	WBC≥2000/mm ³
NEU≥1500/mm ³	NEU≥1500/mm ³
PLT≥75,000/mm ³	PLT≥75,000/mm ³
血清クレアチニン:施設基準値上限以下	血清クレアチニン 1.5mg/dl以下
末梢神経障害:Grade 2 以下	
下痢:Grade 1 以下	下痢:Grade 1 以下

持参薬にワーファリンがあれば主治医に報告(ゼローダとの相互作用あり)

<参考文献>

Cassidy J, et al. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorectal cancer.

J Clin Oncol. 2008 Apr 20;26(12):2006-12.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。

おもろまちメディカルセンター 薬剤部