

対象疾患：AC療法(1コース3週)／乳癌

薬品名	薬品名(商品名／略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
ドキソルビシン	アドリアシン注用50／(DOX)	60mg /m ²	点滴静注	15分	day 1	3週ごとに投与
シクロホスファミド	注射用エンドキサン500mg／(CPA)	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1.	3週ごとに投与

副作用

種類	発生頻度
白血球減少(Grade≥3)	3.70%
血小板減少(Grade≥3)	0.10%
吐気・嘔吐(All Grade)	71.20%
下痢(All Grade)	2.90%
発熱(All Grade)	5.50%
脱毛(All Grade)	92.40%

各薬剤の主な副作用	DOX: 骨髄抑制、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、脱毛、心毒性(不可逆性蓄積毒性)
	CPA: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎、不妊、鼻閉、顔面紅潮、皮疹、頭痛、2次発がん

催吐性	高度
血管への影響	DOX: 起壊死性抗がん剤
	CPA: 炎症性抗がん剤

<参考文献>

J Clin Oncol. 1990 Sep;8(9):1483-96. doi: 10.1200/JCO.1990.8.9.1483.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。