

対象疾患：TC療法(1コース3週)／乳癌

薬品名	薬品名(商品名／略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
ドセタキセル	ドセタキセル点滴静注液／(DTX)	75mg/m ²	点滴静注	60分	day 1	3週ごとに投与
シクロホスファミド	注射用エンドキサン500mg／(CPA)	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1.	3週ごとに投与

副作用

種類	発生頻度
好中球減少(Grade≥3)	61.00%
発熱(Grade≥3)	5.00%
感染(Grade≥3)	7.00%
吐気(Grade≥3)	2.00%
関節痛(All Grade)	78.00%
浮腫(All Grade)	34.00%
筋肉痛(All Grade)	33.00%

各薬剤の主な副作用	DTX: 骨髄抑制、悪心、嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化、感染、浮腫・体液貯留(胸水など)
	CPA: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎不妊、鼻閉、顔面紅潮、皮疹、頭痛、2次発がん

催吐性	中等度
血管への影響	DTX: 起壊死性抗がん剤
	CPA: 炎症性抗がん剤

<参考文献>

J Clin Oncol. 2006 Dec 1;24(34):5381-7. doi: 10.1200/JCO.2006.06.5391.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。