

対象疾患: weekly nab-PTX+RAM療法／胃癌

薬品名	薬品名(商品名／略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
nab-パクリタキセル	アブラキサン点滴静注用100mg／(nab-PTX)	100mg /m ²	点滴静注	30分	day 1.8.15	4週ごとに投与
ラムシルマブ	サイラムザ点滴静注液／(RAM)	8mg/kg	点滴静注	60分	day 1.15	4週ごとに投与

副作用

種類	発生頻度
発熱性好中球減少	4.70%
白血球減少(Grade≥3)	27.90%
好中球減少(Grade≥3)	76.70%
リンパ球減少(Grade≥3)	2.30%
貧血(Grade≥3)	11.60%
食欲不振(Grade≥3)	7.00%
高血圧(Grade≥3)	4.70%
タンパク尿(Grade≥3)	4.70%
悪心(Grade≥3)	2.30%
深部静脈血栓(Grade≥3)	2.30%

各薬剤の主な副作用	nab-PTX: 骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、筋肉痛、関節痛、皮疹、悪心
	RAM: 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション、消化管穿孔、出血、高血圧、腹痛、疲労

催吐性	軽度
血管への影響	nab-PTX: 起壊死性抗がん剤

<参考文献>

Eur J Cancer. 2018 Mar;91:86-91. doi: 10.1016/j.ejca.2017.11.032.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。