

対象疾患:DXR 単独療法／軟部肉腫

| 薬品名 | 薬品名(商品名／略号) | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 投与スケジュール |
|---------|---------------|---------------------------|------|------|----------|----------|
| ドキソルビシン | ドキソルビシン塩酸塩注射用 | 60mg～75mg /m ² | 点滴静注 | 15分 | day 1.22 | 21日毎に投与 |

副作用

| 種類 | 発生頻度 |
|----------------|--------|
| 好中球減少(Grade≥3) | 37.00% |
| 白血球減少(Grade≥3) | 18.00% |
| 発熱性好中球減少 | 13.00% |
| 貧血(Grade≥3) | 4.00% |
| 血小板減少症 | <1.0% |
| | |
| | |

| | |
|----------|--|
| 薬剤の主な副作用 | DXR:心筋障害、汎血球減少、貧血、白血球減少、好中球減少、血小板減少等の骨髄機能抑制及び出血、ショック、間質性肺炎 |
|----------|--|

| | |
|--------|--------------|
| 催吐性 | 高度(催吐性)リスク |
| 血管への影響 | DXR:起壊死性抗がん剤 |

<参考文献>

Lancet Oncol. 2014 Apr;15(4):415-23. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70063-4. Epub 2014 Mar 5.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。

おもろまちメディカルセンター 薬剤部